

IRONMAX PRO

Registreerimisnumber: 682/07.12.17

Kasutusvalmis sööt, sisaldab 24,2 g/kg raud(III)fosfaati

Tigude ja nälkjate tõrjumiseks põldudel, köögivilja-, puuvilja- ja iluaedades ning kasvuhoonetes

OHUTUSABINÕUD

P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P280 Kanda kaitsekindaid ja kaitserõivastust.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Kaitsevahendid

Tõrjevahendit kasutades tuleb kanda isikukaitsevahendeid ning kui on võimalik ja mõistlik, siis laotada mehaanilise puisturi abil.

Keskkonnakaitse

Mitte valada äravoolutorustikesse. Mitte puhastada laotamisseadmeid pinnavee lähedal.

Säilitamine ja kõrvaldamine

Hoida toidust, joogist ja loomasöödast eemal.

Mitte kasutada tühja või originaalpakendit muudeks otstarveteks. Tühi pakend ja vahendi jäägid viia ohtlikke jäätmeid käitlevasse ettevõttesse või kogumispunkti, välja arvatud tühjad puhtad pakendid, mida võib kõrvaldada mitteohtlike jäätmetena.

Tervise- ja keskkonnoahtude vältimiseks järgida kasutusjuhiseid.

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Netokaal {1–5 kg} {5–25 kg} {200–1000 kg}

Loa omanik:
De Sangosse SAS
CS10005
47480 Pont-du-Casse
Prantsusmaa

Partii nr ja tootmiskuupäev: vaata pakendilt

IRONMAX PRO, mis on turustatud 1–5 kg ja 5–25 kg suurustes pakendites, on lubatud osta ja kasutada ilma taimekaitsetunnistust omamata. IRONMAX PRO, mis on turustatud suuremas pakendis, võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik!

Kasutusala: söödavate ja mitesöödavate kultuuride kaitse, täpsemalt vaadake kasutusjuhendist.

Kulunorm ühel kasutuskorral: 7 kg toodet hektari kohta.

Suurim kulunorm ühel aastal: 28 kg toodet hektari kohta aastas.

Kõige hilisem kasutusaeg: vaadake kasutusjuhiseid.

ENNE KASUTAMIST TUTVUDA ETIKETIGA. TAIMEKAITSEVAHENDITE KASUTAMISEL TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHEIDIT

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

KASUTUSJUHISED

NB! Käesolev teave kuulub toote märgistuse juurde ja on sellisena heaks kiidetud. Toote ohutuks ja edukaks kasutamiseks tuleb kõik allolevad juhised tähelepanelikult läbi lugeda.

Hoiatused

Suhkrupeedi, söödapeedi, söögipeedi, kaalika, naeri, porgandi, juurselleri, redise, õlikultuuride, teravilja, muru ja heintaimede kasvatamisel tuleks tõrjevahendit kasutada taimekasvu algetappides. Hilisemates kasvuetappides ei pruugi tõrjumisest kasu olla.

Toote tõhusust *Arion lusitanicus* (Hispaania teetigu) tõrjumisel ei ole tõendatud.

IRONMAX PRO-d ei ole katsetatud ka maa all elavatel nälkjatel, nagu näiteks perekonda *Milax* kuuluvad liigid, seega tõrjevahend ei pruugi ära hoida nende tekitatavaid kahjustusi taime maa-alustele osadele.

Sööta tarvitanud nälkjad poevad raud(III)fosfaadi toime tõttu maa alla, kus nad surevad, mistõttu surnud nälkjaid näha ei ole. Tõrjumise mõju ei pruugi seega olla vahetult jälgitav. Seda tuleks mõõta kultuuridel nähtavate söömiskahjustuste vähenemise põhjal. IRONMAX PRO-ga tõrjumise tulemuslikkust saab seega hinnata ainult kahjustatud taimede arvu vähenemise järgi.

Avamaakultuurid

Kultuurid	Kasvuetapid (BBCH)
Suhkrupeet, söödapeet, peet, kaalikas, naeris, porgand, juurseller, redis	00 ¹ - 14
Mugulsibul, küüslauk	00 ¹ kuni saagikoristuseni
Lillkapsas, brokoli, peakapsas, brüsseli kapsas (e rooskapsas)	00 ¹ kuni saagikoristuseni
Erinevad salatitaimed Spinat ja muud sarnased lehttaimed (nt lehtpeet) Ürdid (nt aed-harakputk, murulauk, lehtseller, petersell, rosmariin, tüümian, basiilik, loorber)	00 ¹ kuni saagikoristuseni
Herned ja oad (värsked) Herned ja oad (kuivatatavad)	00 ¹ kuni saagikoristuseni
Seller, apteegitill, porrulauk, murulauk	00 ¹ kuni saagikoristuseni
Õlikultuurid (nt õliraps, lina, moon, seesam, päevalilled, sojaoad, sinep, talikõrvits, harilik kurgirohi, harilik tuder, kanep)	00 ¹ kuni saagikoristuseni
Teraviljad (nisu, oder, kaer, rukis, tritikale)	00 ¹ kuni saagikoristuseni
Mais, suhkrumais	00 ¹ kuni saagikoristuseni
Kultuurkarjamaade heintaimed (raihein)	00 ¹ kuni saagikoristuseni
Muru	Igal ajal

Kasvuhoonekultuurid

Kultuurid	Kasvuetapid (BBCH)
Tomat, pipar ja tšillipipar, baklažaan	00 ¹ kuni saagikoristuseni
Kurk, kabatšokk, melon, arbuus	00 ¹ kuni saagikoristuseni
Erinevad salatitaimed Spinat ja muud sarnased lehttaimed (nt lehtpeet) Ürdid (nt aed-harakputk, murulauk, lehtseller, petersell, rosmariin, tüümian, basiilik, loorber)	00 ¹ kuni saagikoristuseni

¹ alates 7. päevast enne külvamist/istutamist

Laotamine

IRONMAX PRO-d võib laotada mehaanilise puisturi abil või käsitsi. Käsitsi on tõrjevahendit parem puistata väikestele pindadele, näiteks kasvuhoonesse. Graanulite koospüsivuse kohta laialt laotamisel ja püsivuse kohta välitingimustes ei ole andmeid.

Laotamisel tuleb jälgida, et graanulid ei jääks pidama lehtedele, õitele ega muudele taimeosadele.

Üle 25 kg kaaluvate mahutite teisaldamiseks kasutada mehaanilisi vahendeid.

Soovitused kulunormide kohta

Kulunorm ühel kasutuskorral: 7 kg/ha.

Kasutuskordade ajaline vahe ja arv

Mõnikord on vaja tõrjet teha korduvalt, eriti kui graanulid süüakse ära või ilmuvad järglased.

Kasutuskordade ajaline vahe: vähemalt 5 päeva.

Vahendit võib ühel kultuuril kasutada maksimaalselt 28 kg/ha aastas.

Tõrje ajastamine

Parimaid tulemusi annab tõrjumine enne kahjustuste teket. Üheaastaste kultuuride puhul soovitatakse tõrjet teha enne taimede tärkamist. Toode puistata külviks ettevalmistatud pinnasele.

Tõrje ajastamist määravad tegurid

- Kahjurite avastamine või nende tõenäoline tegevus
- Tõrjumisstrateegia sõltub sellest, millised on kahjurite poolt kahjustatavad taimeosad: seemned, kasvavad taimed või koristusküps saak.

Juhuslikul mahasattumisel

Isiklikud ettevaatusabinõud

Kasutada ühekordseid lateks- või muid sarnaseid kindaid.

Reostuse likvideerimine

Sööt koguda kokku sobivate tööriistade abil pühkides või imedes, järgides ülalkirjeldatud ohutusnõudeid. Koguda kokku nii palju toodet kui võimalik, panna märgistatud hoiu anumasse (tünni) ja viia ohtlikke jäätmete kogumiskohta.